


→ Observation de la mâchoire inférieure.



**I** – *i* = incisive

**C** – *c* = canine

**P** – *p* = prémolaire

**M** = molaire

*en minuscule italique* : dents de lait


**En MAJUSCULE** : dents définitives

**P1, M1, M2, M3** n'existent qu'en dents définitives. Attention : **P1** est parfois absente ou présente d'un seul côté. **P1** apparaît entre 5 et 8 mois.

## Différenciation entre dents de lait et dents définitives (mâchoire inférieure)

	lait	Définitive	
<i>i1 &amp; i2</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Section circulaire</li> <li>Etroite</li> <li>Gorges latérales absentes ou peu marquées</li> <li>Renflement central absent ou peu marqué</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Section rectangulaire</li> <li>Large</li> <li>2 gorges latérales présentes</li> <li>1 renflement central marqué</li> </ul>	<b>I1 &amp; I2</b>
<i>i3 &amp; c</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effilée</li> <li>Pointue</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Large</li> <li>Arrondie</li> </ul>	<b>I3 &amp; C</b>
<i>p4</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 lobes</li> <li>ressemble à une molaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 lobes</li> <li>ressemble à une prémolaire</li> </ul>	<b>P4</b>

Classes d'âge	Visible à l'avant	Visible à l'arrière
Naissance	<b><i>i3, c</i></b>	<b><i>p3, p4</i></b>
1 mois	<i>i3, c, i1</i>	<i>p3, p4, p2</i>
2-4 mois	<i>i3, c, i1, i2</i>	<i>p3, p4, p2</i>
5-6 mois	<i>i3, c, i1, i2, P1</i>	<i>p3, p4, p2, M1</i>
7-11 mois	<i>i1, i2, P1, I3, C</i>	<i>p3, p4, p2, M1</i>
12-14 mois	<i>i2, P1, I3, C, I1</i>	<i>p3, p4, p2, M1, M2</i>
14-18 mois	<i>i2, P1, I3, C, I1</i>	<b>M1, M2, P2, P3, P4</b>
19-22 mois	<b>P1, I3, C, I1, I2</b>	M1, M2, P2, P3, P4
> 22 mois	<b>P1, I3, C, I1, I2</b>	M1, M2, P2, P3, P4, <b>M3</b>



I = incisives ; C = canines ; P = prémolaires ; M = molaires

En minuscule : dent de lait - En MAJUSCULE : dent définitive

< 6 mois


p2 → 1 mois  
i2 → 2-4 mois

Absence de **M1** – p4 trilobée



< 5 mois

**M1** en croissance (et **P1** apparaît parfois) – p4 trilobée



± 5 mois


i1, i2, i3



< 6 mois


**6-12 mois**

**M1** complètement sortie – *p4* trilobée



6-12 mois

*i1, i2, I3*




7-11 mois

**12-14 mois**

**M1** complètement sortie  
*p4* trilobée


**I1, i2, I3**




**I1** en croissance

**14-18 mois**

*p4* trilobée + **M2**



**I1, i2, I3**




**I1** et *i2* sont au même niveau  
Chez les mâles : à **15 mois**, les défenses touchent les grès

19-22 mois

P4 bilobée + M2




I1, I2, I3



I2 en croissance

22-24 mois

P4 bilobée + M3 en croissance




I1, I2, I3



I1 et I2 sont au même niveau

> 24 mois

P4 bilobée + M3 installée



> 36 mois quand M3 commence à s'user